

子どもの定期予防接種 (乳幼児)

問合せ先	・ 国東保健センター ☎ 0978-73-2450	・ 国見総合支所 ☎ 0978-82-1112
	・ 武蔵保健福祉センター ☎ 0978-68-1184	・ 安岐総合支所 ☎ 0978-67-1111

種類	開始時期	回数	間隔	備考
ヒブ	①生後2か月以上7か月未満 (※1)	生後12か月までに 初回3回(※2)	27日以上(標準的には27~56日まで) (医師が必要と認めた場合は20日~)	※1) ①の時期の開始が望ましい ※2) 初回接種を終了せずに生後12か月を超えた場合は、残りの接種は行わず、初回の最後の接種から27日(医師が認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回の追加接種を行う
		追加1回	初回終了後7か月以上(標準的には7~13か月まで)	
	②生後7か月以上12か月未満	生後12か月までに 初回2回(※2)	27日以上(標準的には27日~56日まで) (医師が必要と認めた場合は20日~)	
		追加1回	初回終了後7か月以上(標準的には7~13か月まで)	
	③1歳以上5歳未満	1回		
小児肺炎球菌	①生後2か月以上7か月未満 (※3)	初回3回 (※4)	生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上	※3) ①の時期の開始が望ましい ※4) 初回接種は、生後24か月まで接種可能ですが、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合初回3回目の接種は行えません (追加接種は実施可能) ※5) 初回接種は、生後24か月を超えた場合、接種は行えませんが、追加接種は実施可能です
		追加1回	初回終了後60日以上で、1歳以降 (標準として生後12か月~15か月の間)	
	②生後7か月以上12か月未満	初回2回 (※5)	生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上	
		追加1回	初回終了後60日以上で、1歳以降	
	③1歳以上2歳未満	2回	60日以上	
	④2歳以上5歳未満	1回		

種類	接種時期	回数	間隔	備考
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	出生6週0日後から24週0日後まで(※1、2)	27日以上	※1) 標準的には初回接種を生後2か月~15週未満の間に接種する ※2) 初回接種を15週以降に受けることは、安全性の観点からお勧めしていません。
	ロタテック (5価)	出生6週0日後から32週0日後まで(※1、2)		
B型肝炎	出生から1歳未満(※6)	1回目	27日以上	※6) 標準的には生後2か月~9か月の間に3回接種する ※7) 任意で接種した回数分は接種したものとする
		2回目		
		3回目	1回目終了後139日以上	
4種混合	生後3か月以上90か月未満	1期	20日以上(標準的には~56日まで)	※8) 生後3か月以降できるだけ早く行う
		初回3回 (※8)		
	追加1回			
BCG	生後5か月から12か月未満	1回		
MR (麻しん風しん)	生後12か月以上から24か月未満(※9)	1期	1回	※9) 1歳のお誕生日以降できるだけ早く行う ※10) 小学校入学前に必ず済ませましょう!
	小学校就学前の1年(※10)	2期	1回	
水痘	①生後12か月以上36か月未満	2回(※11)	3か月以上(標準的には生後12~15か月に達する間に1回目、1回目終了後6~12か月までの間隔をおいて2回目)	※11) 任意で接種した回数分は接種したものとする ※12) 既に水痘にかかった者は対象外とする
日本脳炎	3歳から4歳未満(※13)	1期	初回2回	※13) 生後6か月から接種可能です。 ※14) おおむね1年とは11か月~13か月
	4歳から5歳未満		追加1回	