

# 子どもの定期予防接種（小学生以上）

問合せ先

- ・ 国東保健センター ☎ 0978-73-2450
- ・ 国見総合支所 ☎ 0978-82-1112
- ・ 武蔵保健福祉センター ☎ 0978-68-1184
- ・ 安岐総合支所 ☎ 0978-67-1111

種 類		対象者	回 数	標準的な接種期間	標準的な接種間隔	備 考
日本脳炎 第2期		9歳以上 13歳未満 （※1）	1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間		※1 令和4年度は小学4年生・小学5年生に案内文書を送付します。
二種混合		11歳以上 13歳未満 （※2）	1回	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間		※2 小学6年生時に市から案内文書を送付します
ヒトパピローマウイルス感染症	サーバリックス （2価）	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子（小学6年生～高校1年生相当）	3回	13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間（中学1年生）	約6月の間に合計3回接種 （①初回、②初回から1月後、③初回から6月後 の計3回）※3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ヒトパピローマウイルス感染症予防接種につきましては、令和4年4月から積極的勧奨再開します。対象の方には個別に案内文書を送付予定です。</li> <li>※3 標準的な接種間隔を取ることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回注射した後、第1回目の注射から5月以上、かつ第2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて1回行うことができる。</li> <li>※4 標準的な接種間隔を取ることができない場合は、1月以上の間隔をおいて2回注射した後、第2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行うことができる。</li> <li>※5 1回目と2回目は少なくとも5月以上空けること。5月未満の場合、3回目の接種が必要になります。</li> </ul>
	ガーダシル （4価）				約6月の間に合計3回接種 （①初回、②初回から2月後、③初回から6月後 の計3回）※4	
	シルガード9 （9価）				1回目を接種してから、6月後に2回目接種※5	
			【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】 2回			
			【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】 3回			
					約6月の間に合計3回接種 （①初回、②初回から2月後、③初回から6月後 の計3回）※4	