


# 国東オリーブ夏季(7~8月)の栽培管理

## ハマキムシの防除(植え付け1年~)

8月下旬~9月上中旬にかけて、ハマキムシ(主にマエアカスカシノメイガ)の幼虫に新芽が食害を受けます。新芽を巻いて中に潜み、葉の表皮を食べるので食害痕は非常に見分けやすいですが、発見が遅れると既に食べつくした後であることも多いです。特に若木が多く食害を受けると、生育に影響が出るほどの被害を受けます。ダントツ水溶剤かアディオン水和剤を使用して、それでも被害が止まらない場合はもう一度使用しましょう。



**ダントツ水溶剤**  
果実:収穫前日  
年2回以内



**アディオン水和剤**  
果実:収穫7日前  
年2回以内

倍率:2,000倍  
使用方法:散布  
期間:8月下旬~  
9月上中旬

**ハマキムシ**



## 除草剤

雑草管理を怠ると、幼木であれば樹が勢いに負けたり、大きい樹でもゾウムシが潜む場所となりますので、定期的な除草を行いましょう。刈払い機でも除草剤を使用しても構いません。オリーブに使用できる除草剤です。散布時はなるべくオリーブの葉に当たらない散布を心がけてください。また散布する器具は、農薬と除草剤は別の物を使用して下さい。

薬剤名	倍率	使用方法	使用回数	収穫前日数
ラウンドアップ マックスロード	25~500倍	雑草茎葉散布 	合わせて	7日前まで
サンフーロン	50~400倍		3回以内	7日前まで
ザクサ液剤	100~500倍		3回以内	前日まで
プリグロックSL	50~187.5倍		5回以内	前日まで

