

国東オリーブの「今」を伝えます！

第9号くにさきオリーブだより



OLIVE JAPAN® 2024

国際オリーブオイルコンテスト受賞者発表！

国東オリーブ振興協議会員より出品したすべてのオイルが受賞 ✨



金賞 国東クリーブガーデン受賞！



OLIVE



『九州フレーバー』オリーブオイル
with 大分かぼす



『九州フレーバー』オリーブオイル
with 宮崎ひゅうがなつ



『九州フレーバー』オリーブオイル
with 熊本グリーンレモン



銀賞 国東クリーブガーデン/JAおおいたオリーブ部会



「夢雫 (早摘み)」



JAおおいたくにさきオリーブ部会

OLIVE JAPAN® 2024 国際オリーブオイルコンテストとは？

全766品に上るエントリーの中から最優秀賞8品、多田俊哉（審査会実行委員長）オリーブオイル
ソムリエ特別賞10品、金賞318品、銀賞207品ならびに各国ベスト賞を決定するコンテストです。

※OLIVE JAPAN® HPより一部引用

商品はこちらで取扱い中 ※完売の場合はご了承ください



国東クリーブガーデン 🔍



▼JAおおいたオリーブ部会はこちらから

くにさきつうはん オリーブ 🔍



くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理



梅雨明けは
殺菌剤！

植付1年～ 炭疽病殺菌剤の散布

以下 **3** 種類のうち **いずれかひとつ** 使用します



梅雨明けに（目安7月下旬）全体散布



1 アミスター10フロアブル

効果は高く、病気を治癒する能力もある
※「アミスター20」は野菜用のため使用不可！

希釈倍数：1,000倍
収穫前日数：30日前
使用回数：2回/年



2 クプロシールドフロアブル

銅により菌の感染を抑える。発病した果実を治癒する力はない。ICボルドーと同様の効果

希釈倍数：500～1,000倍
収穫前日数：前日まで
使用回数：制限なし/年



3 icボルドー66D

散布後は白くなるので薬効を一目で見分けられる。周囲も白くなるので住宅地近くの園地の散布は避けた方がよい

希釈倍数：50倍
収穫前日数：制限なし
使用回数：制限なし



24・29 開花講習会を開催しました！



毎年恒例となりました
開花時期に行う講習会と
国東オリーブオイルの
テイスティングを行いました。



大分の空むさし様
里の駅ふるさと市場様
ご協力ありがとうございました！



くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理



8月
防除

植付2年～

オリーブアナアキゾウムシ・カメムシの防除

夏季に枯らさない！

夏季は最も葉が茂り樹が生育する季節ですが…

樹が最も枯れる季節



病害虫発生が多い時期！注意しましょう



近年オリーブアナアキゾウムシの被害が多発
国東では11月以降もゾウムシは発生しています！

スミチオン乳剤は基本 4月・6月・8月の **年3** 回ですが回数が足りません！

3回目は **11** 月に使用したいので

▶ 8月はダントツ水溶剤 or アディオン水和剤



ダントツ水溶剤
希釈倍数：2,000倍
収穫前日数：前日
使用回数：2回/年



アディオン水和剤
希釈倍数：2,000倍
収穫前日数：7日前
使用回数：2回/年

全体散布



カメムシ・ハマキムシには
8 月中旬以降が有効！

カメムシは果実の果汁を吸い
塩水漬け品種の商品価値を低下させます



オリーブアナアキゾウムシの発生が慢性化している園は
⚠ 非常に危険な状態です

- ✓ 木が枯れる原因の大部分が **オリーブアナアキゾウムシ** によるもの
- ✓ 春～秋にかけての防除を **1回でも怠ると** ゾウムシが寄生、根絶が困難となります



定期予防が最も効果が高い対策！


それでもゾウムシが慢性的に発生している場合…



→ Next

くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理

植付2年～ オリーブアナアキゾウムシが
慢性的に発生している場合…



スミチオン乳剤とダントツ水溶剤の連続使用により
オリーブアナアキゾウムシ **0**ゼロを目指します！

樹幹散布

スミチオン乳剤
希釈倍数：50倍
収穫前日数：21日前
使用回数：3回/年

全体散布

ダントツ水溶剤
希釈倍数：2,000倍
収穫前日数：前日
使用回数：2回/年



⚠️ 注意事項

- ✓ 散布方法が違うので **同時に散布することはできません**
- ✓ **1週間程度** 間隔をあけること
- ✓ 2回目の散布は **どの程度ゾウムシがいるのか** 確認しながら散布
- ✓ ダントツ水溶剤 → **アディオン水和剤** でも代用可能 



「薬が効いてない？」と感じた場合の **チェックポイント**

- ✓ 散布ムラはありますか？
- ✓ 薬はよく混ぜていますか？ 薬液の底で沈殿していませんか？
- ✓ 散布直後に降雨はありませんでしたか？
- ✓ ノズルの先端は適切なものを使用していますか？

くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理

全栽培者
対 象

排水不良対策



水はけの悪い土壌は **要注意!**

夏～秋の大雨で生育不良が見られます...

WHY? 園地の滞水により土中の酸素が欠乏するため



もしかして排水不良かも!? チェックリスト




○大雨後に生育が徐々に衰える

➡ 葉の黄化、落葉が目立つ、新芽が少なくなる

○植付け2～3年後に1年以上かけてゆっくり弱っていく

○園地特定箇所の生育が悪い ➡



地下水脈がある



大雨時に水がたまる



対策は3っ ★★

① 水の通り道をつくる

園地や栽培状況により手掘、溝掘機、重機など

② 土壌改良する ➡ 土壌の物理性を改善させる方法も有効

土壌中に空隙を作れるパーライト等やバーク堆肥を投入

③ 移植する ➡ 園地の一部が生育不良になる場合に有効

- ・ 植付1～2年であれば移植後の活着も早く移植作業も容易
- ・ 適期は冬季のため、該当する場合は今の時期から計画

ご不明な場合は問い合わせください



くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理

全栽培者対象



強風対策

主に台風接近時の強風で樹が倒れることが多くあり

木の生育に合った **支柱** を設置しましょう



樹が大きくなると丈夫な支柱が必要

推奨する組み方は

「鳥居型支柱」
+
斜めに1～2本

- ✓ 横方向が弱点！
- ✓ 園地ごと風の通り道が違うため最も弱い方向から守れるように設置

特に1～2年に1回は大きな被害を与える台風が接近します



おしらせ



第2回すてき！だいすき！くにさき！オリーブセミナーの開催について

日時 令和6年8月23日（金）午後開催予定

場所 大分の空むさし

講師 JOOTA認定※ オリーブオイルテイスター 青木 絵麻 先生

内容 講話、オリーブオイルテイスティング
試食会&オリーブオイルも購入できます！



定員先着

20名

※詳細は別途お伝えいたします

※ Japan Olive Oil Taster Associationの略：一般社団法人日本オリーブオイルテイスター協会が国際基準規定に則った正式なオリーブオイルテイスターとして認定している資格のこと