

くにさきオリーブ夏季（7～8月）の栽培管理



8月
防除

植付2年～

オリーブアナアキゾウムシ・カメムシの防除

夏季に枯らさない！

夏季は最も葉が茂り樹が生育する季節ですが…

樹が最も枯れる季節



病害虫発生が多い時期！注意しましょう



近年オリーブアナアキゾウムシの被害が多発

国東では11月以降もゾウムシは発生しています！

スミチオン乳剤は基本 4月・6月・8月の **年3** 回ですが回数が足りません！

3回目は **11** 月に使用したいので

▶ 8月はダントツ水溶剤 or アディオン水和剤



ダントツ水溶剤

希釈倍数：2,000倍

収穫前日数：前日

使用回数：2回/年



アディオン水和剤

希釈倍数：2,000倍

収穫前日数：7日前

使用回数：2回/年

全体散布



カメムシ・ハマキムシには

8 月中旬以降が有効！

カメムシは果実の果汁を吸い

塩水漬け品種の商品価値を低下させます



オリーブアナアキゾウムシの発生が慢性化している園は

⚠ 非常に危険な状態です

✓ 木が枯れる原因の大部分が **オリーブアナアキゾウムシ** によるもの

✓ 春～秋にかけての防除を **1回**でも怠るとゾウムシが寄生、根絶が困難となります



定期予防が最も効果が高い対策！

それでもゾウムシが慢性的に発生している場合…



→ Next