

子どもの定期予防接種（乳幼児）

問合せ先	・ 市役所市民健康課 ☎ 0978-72-5189 ・ 武蔵保健福祉センター ☎ 0978-68-1184	・ 国見総合支所 ☎ 0978-82-1112 ・ 安岐総合支所 ☎ 0978-67-1111
------	--	--

種 類	開 始 時 期	回 数	間 隔	備 考
ヒ ブ (基本は5種混合にて接種)	①生後2か月以上7か月未満 (※1)	生後12か月までに 初回3回(※2)	27日以上(標準的には27～56日まで) (医師が必要と認めた場合は20日～)	※1) ①の時期の開始が望ましい ※2) 初回接種を終了せずに生後12か月を超えた場合は、残りの接種は行わず、初回の最後の接種から27日(医師が認めるときは20日)以上の間隔をおいて1回の追加接種を行う
		追加1回	初回終了後7か月以上(標準的には7～13か月まで)	
	②生後7か月以上12か月未満	生後12か月までに 初回2回(※2)	27日以上(標準的には27日～56日まで) (医師が必要と認めた場合は20日～)	
		追加1回	初回終了後7か月以上(標準的には7～13か月まで)	
	③1歳以上5歳未満	1回		
小児肺炎球菌 (15価・20価) (※6)	①生後2か月以上7か月未満 (※3)	初回3回 (※4)	生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上	※3) ①の時期の開始が望ましい ※4) 初回接種は、生後24か月まで接種可能ですが、初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合初回3回目の接種は行えません (追加接種は実施可能) ※5) 初回接種は、生後24か月を超えた場合、接種は行えませんが、追加接種は実施可能です ※6) 皮下又は筋肉内に接種
		追加1回	<u>初回終了後60日以上で、1歳以降</u> (標準として生後12か月～15か月の間)	
	②生後7か月以上12か月未満	初回2回 (※5)	生後24か月(標準的には生後12か月)までに27日以上	
		追加1回	初回終了後60日以上で、1歳以降	
	③1歳以上2歳未満	2回	60日以上	
	④2歳以上5歳未満	1回		

種 類	接 種 時 期	回 数	間 隔	備 考
ロタ ウイルス	ロタリックス (1価)	出生6週0日後から24週0日後まで (※7、8)	2回	27日以上 ※7) 標準的には初回接種を生後2か月～15週未満の間に接種する ※8) 初回接種を15週以降に受けることは、安全性の観点からお勧めしていません。
	ロタテック (5価)	出生6週0日後から32週0日後まで (※7、8)	3回	
B型肝炎	出生から1歳未満(※9)	1回目	27日以上	※9) 標準的には生後2か月～9か月の間に3回接種する 任意で接種した回数分は接種したものとする
		2回目		
		3回目	1回目終了後139日以上	
5種混合(※10)	生後2か月以上90か月未満	1期	初回3回	※10) 皮下又は筋肉内に接種
			追加1回	
4種混合 (基本は5種混合にて接種)	生後2か月以上90か月未満	1期	初回3回 (※11)	※11) 生後2か月以降できるだけ早く行う
			追加1回	
BCG	生後5か月から12か月未満	1回		
M R (麻しん風しん)	生後12か月以上から24か月未満(※12)	1期	1回	※12) 1歳のお誕生日以降できるだけ早く行う ※13) <u>小学校入学前に必ず済ませましょう！</u>
	小学校就学前の1年(※13)	2期	1回	
水 痘	①生後12か月以上36か月未満	2回(※14)	3か月以上(標準的には生後12～15か月に達する間に1回目、1回目終了後6～12か月までの間隔をおいて2回目)	※14) 任意で接種した回数分は接種したものとする 既に水痘にかかった者は対象外とする
日本脳炎	3歳から4歳未満(※15)	1期	初回2回	※15) 生後6か月から接種可能です。
	4歳から5歳未満		追加1回	※16) おおむね1年とは11か月～13か月