

子どもの定期予防接種（乳幼児）

問合せ先	・ 市役所市民健康課	☎ 0978-72-5189	・ 国見総合支所	☎ 0978-82-1112
	・ 武蔵総合支所	☎ 0978-68-1184	・ 安岐総合支所	☎ 0978-67-1111

種類	開始時期	回数	間隔	備考
小児肺炎球菌 (15価・20価) (※4)	①生後2か月以上7か月未満 (※1)	初回3回 (※2)	生後24か月（標準的には生後12か月）までに27日以上	※1) ①の時期の開始が望ましい ※2) 初回接種は、生後24か月まで接種可能ですが、 初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合 初回3回目の接種は行えません (追加接種は実施可能) ※3) 初回接種は、生後24か月を超えた場合、 接種は行えませんが、追加接種は実施可能です ※4) 皮下又は筋肉内に接種
		追加1回	<u>初回終了後60日以上で、1歳以降</u> (標準として生後12か月～15か月の間)	
	②生後7か月以上12か月未満	初回2回 (※3)	生後24か月（標準的には生後12か月）までに27日以上	
		追加1回	初回終了後60日以上で、1歳以降	
		③1歳以上2歳未満	2回	
④2歳以上5歳未満	1回			

種類	接種時期	回数	間隔	備考
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	2回	27日以上	※5) 標準的には初回接種を生後2か月～15週未満の 間に接種する ※6) 初回接種を15週以降に受けることは、安全性 の観点からお勧めしていません。
	ロタテック (5価)	3回		
B型肝炎	出生から1歳未満 (※7)	1回目	27日以上	※7) 標準的には生後2か月～9か月の間に3回接種する 任意で接種した回数分は接種したものとする
		2回目		
		3回目	1回目終了後139日以上	
5種混合 (※8)	生後2か月以上90か月未満	1期 初回3回	20日以上（標準的には～56日まで）	※8) 皮下又は筋肉内に接種
		追加1回	初回3回目終了後6か月以上（標準的には6～18か月）	
BCG	生後5か月から12か月未満	1回		
MR (麻しん風しん)	生後12か月以上から24か月未満 (※9)	1期 1回		※9) できるだけ早く行う ※10) 小学校入学前に必ず済ませましょう!
	小学校就学前の1年 (※10)	2期 1回		
水痘	①生後12か月以上36か月未満	2回 (※11)	3か月以上（標準的には生後12～15か月に達する間に1回目、 1回目終了後6～12か月までの間隔をおいて2回目）	※11) 任意で接種した回数分は接種したものとする 既に水痘にかかった者は対象外とする
日本脳炎	3歳から4歳未満 (※12)	1期 初回2回	6日以上（標準的には6日～28日まで）	※12) 生後6か月から接種可能です。 ※13) おおむね1年とは11か月～13か月
	4歳から5歳未満		初回終了後6か月以上（標準的にはおおむね1年） (※13)	